

Consignes. La cotation a lieu avec un gardien du temps qui donne le top départ et le top de fin, un secrétaire qui entoure les cases et un lecteur (auto-désignation).
Le score retenu est le plus élevé observé = métaphore de la marée : la hauteur de marée la plus haute fait décider de la hauteur de la digue.
Plus les signes sont sévères, plus la cotation est rapide, du temps gagné pour la discussion qui a lieu après la cotation.

1 Remettre une feuille d'évaluation à chaque participant pour qu'il puisse suivre facilement la cotation.

2 Choisir ensemble la période qui va être évaluée (ex : les 7 derniers jours ou la période depuis l'entrée).

3 Lire à voix haute le libellé des cases, en allant du plus sévère vers le moins sévère.

4 Arrêter la lecture et encercler le score dès qu'un participant reconnaît un symptôme (dire oui à voix haute).

NOM (ou initiale):

PRÉNOM (ou initiale):

Date de naissance:

Date du jour:

Période évaluée:

Durée de la cotation:

H O F O

Paraphes des soignants présents à l'évaluation :

VIOLENCES déconcertantes				
Crainte et peur d'être agressé				
avec le REGARD				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Regard de haine ou mimique de fureur	Regard de colère ou mimique de colère	Regard noir ou mimique grimaçante	Regard hostile ou mimique hostile	Regard normal et mimique normale
avec la VOIX				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Hurllements	Cris	Gémissement ou ronchonnement ou grognement	Voix hostile	Voix normale
avec les PAROLES				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Menaces	Accusations ou insultes avec personnalisation de l'insulte	Insultes sans personnalisation de l'insulte	Reproches ou disqualifications	Absence d'agression verbale
avec les GESTES				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Attaque des personnes avec danger réel (morsure, coup de poing)	Attaque des personnes sans danger réel (agrippe, griffe, gifle, crachats)	Geste de menace sur les personnes (index levé, poing serré)	Renverse, jette au sol, détruit ou vole les objets (poche de stomie...)	Absence d'agression physique

REFUS déconcertants (refus, opposition, passivité, apathie)				
Impuissance, embarras et culpabilité de ne pas arriver à faire accepter une proposition				
de la COMMUNICATION				
Paroles spontanées, réponses aux questions et communication non verbale				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Communication impossible (pseudocoma)	Communication limitée au minimum avec les yeux	Communication obtenue avec négociation	Se met à parler avec quelques paroles simples	Communique et parle de façon habituelle
de la MOBILISATION				
Mobilisation au lit, position assise, station debout, marche				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Mobilisation impossible (pas de lever, grabatisation)	Mobilisation limitée au minimum avec passage du lit au fauteuil	Mobilisation obtenue avec négociation et aide physique	Se met à se déplacer avec quelques paroles simples	Se déplace et se laisse mobiliser de façon habituelle
de l'ALIMENTATION				
Aliments et boissons				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Alimentation et boisson impossibles (risque vital)	Alimentation et boisson limitées au minimum (recrache)	Alimentation et boisson obtenues avec négociation et aide physique	Se met à manger et boire avec quelques paroles simples	Mange et boit de façon habituelle
des SOINS				
Soins d'hygiène, toilette, bains, soins infirmiers, prise des médicaments et constantes, animations				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Soins impossibles (risque vital)	Soins limités au minimum	Soins obtenus avec négociation et aide physique	Se met à accepter les soins avec quelques paroles simples	Les soins sont effectués de façon habituelle

PAROLES déconcertantes				
Inquiétude et anxiété anticipatoire nécessitant présence et vigilance				
ORDRES, DEMANDES ou PAROLES SANS OBJET répétées en excès				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Ordres ou exigences contradictoires sans réponse possible	Demandes incessantes ne pouvant pas être satisfaites	Paroles ou mots répétés en boucle (écholalie)	Paroles en quantité excessive (logorrhée euphorie)	Paroles en quantité habituelle
PAROLES ANXIEUSES, plaintes corporelles et APPELS à l'aide				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Paroles anxieuses ou plaintes corporelles avec crise d'anxiété	Paroles anxieuses ou plaintes corporelles avec appels fréquents	Paroles anxieuses ou plaintes corporelles avec appel épisodique	Paroles anxieuses ou plaintes corporelles sans appel	Absence de parole anxieuse ou de plainte corporelle
PAROLES DÉPRESSIVES sur la vie et sur la mort				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Tentative de suicide ou comportement équivalent	Paroles exprimant un projet de se suicider « Je vais me suicider »	Paroles exprimant un désir de mort « Je veux mourir »	Paroles expri. une perte du désir de vivre « Je ne veux plus vivre »	Paroles habituelles sur la vie et sur la mort
PAROLES à côté de la REALITE, délire, hallucination, mensonge, fabulation				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Paroles délirantes ou hallucinations avec passage à l'acte	Paroles délirantes ou hallucinations sans passage à l'acte (certitude)	Paroles délirantes ou hallucinations ou mensonges ou fabulations (probabilité)	Paroles délirantes ou hallucinations ou mensonges (possibilité)	Absence de parole délirante, d'hallucination de mensonge de fabulation

ACTES déconcertants				
Inquiétude et anxiété anticipatoire nécessitant présence et vigilance				
ACTES et perte de contrôle de la sphère locomotrice GLOBALE				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Disparitions ("fugues"), automutilations (doigt écrasé, chutes au sol)	Déambulation avec intrusions dans les chambres kleptomane	Déambulation avec suivi à la trace des soignants	Agitation (bouge les bras ou les jambes, tourne en rond)	Comportement locomoteur habituel
ACTES et perte de contrôle de la sphère alimentaire et ORALE				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Mange des choses toxiques ou non comestibles (ex : produit ménager)	Mange des choses dégoûtantes (ex : excréments)	Mange trop et trop vite avec risque de fausses routes (gloutonnerie)	Mange trop (boulimie)	Comportement oral habituel
ACTES et perte de contrôle des sphères URINAIRE et ANALE				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Etale ses excréments	Déjections inadaptées ou refus inadapté des protections	Mictions inadaptées constantes	Mictions inadaptées par épisodes	Fonctions sphinctériennes habituelles
ACTES et perte de contrôle de la sphère sexuelle et GÉNITALE				
très fort = 4	fort = 3	moyen = 2	léger = 1	absent = 0
Agression sexuelle sur personne vulnérable ou masturbation traumatique	Contacts à caractère sexuel inadaptés (attouchements sexuels)	Gestes à caractère sexuel inadaptés (exhibition, masturbation en public)	Propositions à caractère sexuel, érotisation, préoccupations sexuelles envahissantes	Vie sexuelle sans particularités

Score VIOLENCES

Score REFUS

Score PAROLES

Score ACTES

Score TOTAL

Crainte Peur d'être agressé

Impuissance Embarras Culpabilité

Inquiétude Anxiété anticipatoire

Inquiétude Anxiété anticipatoire

Reconnaissance des difficultés de l'aide relationnelle

+

+

+

+

=

si score > 17 (valeur seuil)

Risque d'attitudes relationnelles spontanées inappropriées

Recherche de causes réversibles : urgence (conf. médt. douleur)

Chance d'attitudes relationnelles appropriées à co-construire

Mise à Jour : 13/11/2025 - Téléchargement : www.psychoge.fr

Copyright © Monfort JC, Lezy AM, Papin A, Tezenas S

2018 : Prix spécial du jury SF3PA (Société Francophone de Psychogériatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée)

2019 : Prix coup de cœur FormaticSanté et SFTeMed (Société Fr. de TéléMédecine devenue Soc. Fr. de Santé Digitale)

2020 : Publication dans la revue "International Psychogeriatrics". PGI-DSS : validity and reliability compared to the NPI-ANH

2022 : CNSA Guide PATHOS les symptômes doivent impérativement être décrits et documentés EPADe, NPI, CMAI

2024 : Nouvelles Recommandations Nationales la page13 remplace les recos HAS 2009

Évaluation

Violence

Crainte et peur (d'être agressé) → **Attitudes inappropriées**
Répondre en miroir
Monter en tension
Sédation - Contention

Réflexion

Urgence du corps: **Confusion agitée.** Iatrogénie / Sevrage
Douleur - fracture / Inconfort
Crise d'hypoglycémie / Epilepsie (non convuls.)
Globe / Fécôme

Souffrance de l'esprit: Besoin non satisfait, négligence/maltraitance
Hypomanie / Dépression hostile
Personnalité borderline / sans empathie

Souffrance de l'enfance: Enfant battu - Enfant à la rue

Action

Attitudes appropriées

- > Chercher les motifs expliquant la violence
- > Tenir l'insulte (sans la prendre pour soi)
- > Valoriser le patient, demander son aide
- > Oser poser une limite avec douceur

Évaluation

Refus

Impuissance
Embarras
et culpabilité (de ne pas arriver à faire accepter une proposition) → **Attitudes inappropriées**
Passer en force
Insister sans comprendre
Impuissance + bienveillance = mélange à haut risque

Réflexion

Urgence du corps: **Confusion ralentie.** Iatrogénie / Surdosage
(« apathie aigue »)
Douleur - fracture / Inconfort
Apnée du sommeil, Infection

Souffrance de l'esprit: Besoin non satisfait, négligence/maltraitance
Déficit psychotique
Personnalité dominante devenue dépendante

Souffrance de l'enfance: Enfant abandonné - négligé - rejeté

Action

Attitudes appropriées

- > Reconnaître le droit au consentement c'est :
- Accepter le droit au refus
- Donner raison à la personne qui refuse
- > Partir pour mieux revenir
- > Parler de tout et de rien, valoriser le patient
- > Refaire la proposition / Demander son aide
- > Oser dire que changer d'avis est possible



Avant = Risques

EPADE

Après = Chances



Ensemble
Mini Staff

Débordement émotionnel

1) Évaluation

Nommer les émotions

Dépassement émotionnel

Mesure du niveau de l'aide relationnelle entre zéro et 64
Reconnaissance de la légitimité des difficultés émotionnelles

Perte de chances

2) Réflexion

Rechercher une cause

Chances

Passer à côté d'une cause réversible

Trouver un presque rien réversible

Mise en commun des informations
ce qui a changé, ce qui a été vu, entendu, vécu, su : du présent, du passé, du futur

Pari du sens - Théorie du seuil

Chercher une urgence / un sevrage-surdosage / une douleur / une hypoglycémie / ...

Chercher une souffrance / un besoin / une maltraitance / un contexte qui déclenche, aggrave ou qui apaise

Chercher dans le passé des mémoires traumatiques / Ruban du temps / Histoire de vie / Historiogramme / Géosociogramme (parents ancêtres)

Attitudes inappropriées

3) Action sur la relation

Ajustement

Attitudes appropriées

réagir du tac au tac

écouter, entendre, comprendre
apaiser, désamorcer

Évaluation

Paroles

Inquiétude
Anxiété anticipatoire
que va-t-il encore dire ?
que vais-je répondre ? → **Attitudes inappropriées**
Faire taire
Répondre avec vivacité :
Cela suffit !
Ah, stop, taisez-vous !
Vous êtes collant à la fin !

Réflexion

Urgence du corps: **Confusion anxieuse.** Iatrogénie / Sevrage
Douleur corporelle / Inconfort
Péritonite, embolie pulmonaire

Souffrance de l'esprit: Besoin non satisfait, négligence/maltraitance
Anxiété de séparation / d'abandon
Épisode maniaque / Syndrome frontal
Personnalité obsessionnelle / hypocondriaque

Souffrance de l'enfance: Dissimulations / Non-dits
Secrets de familles / Deuils non faits / NDE

Action

Attitudes appropriées

- > Se taire (« tenir la plainte » avec sollicitude)
- > Entendre, comprendre le sens caché
- > Clarifier
- > Reformuler avec empathie
- > Oser exprimer un avis avec respect

Évaluation

Actes

Inquiétude
Anxiété anticipatoire
que va-t-il encore faire ?
que vais-je faire ? → **Attitudes inappropriées**
S'opposer
Dire sans ménagement :
Cela suffit !
Ah, stop, arrêtez-ça !
On ne peut pas
vous laisser faire cela

Réflexion

Urgence du corps: **Confusion désinhibée.** Iatrogénie / Sevrage
Douleur corporelle / Inconfort / Prurit - Gale
Hypoglycémie / Epilepsie

Souffrance de l'esprit: Besoin non satisfait, négligence/maltraitance
Peur de la mort / Ennui
Épisode maniaque / Syndrome frontal
Personnalité impulsive

Souffrance de l'enfance: Ambiance incestuelle
Incestes - viols

Action

Attitudes appropriées

- > Reconnaître l'enfant à l'oeuvre (acte archaïque)
- > Répondre aux actes par des activités :
- Faire diversion,
- Utiliser des médiations
- Art thérapie, Activités (ré)créatives, Culture